

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Zantac⁷⁵ film coated tablets
Зантак⁷⁵ филмирани таблетки

съдържащи 75mg ранитидин (ranitidine) под формата на хидрохлорид (as hydrochloride)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 5898 /	30.09.2009
Одобрено: 38 / 15.06.09	

РУ - 9700362

Моля, преди употреба прочетете внимателно тази листовка.

Какво има в опаковката?

Zantac⁷⁵
Зантак⁷⁵

Таблетките **Зантак⁷⁵** са с розов цвят и петогълна форма.
Картонената кутия съдържа полиетиленови блистери с алуминиево фолио.
Всеки блистер съдържа 6 броя таблетки.
Опаковки от 6 или 12 таблетки.

Какво съдържа ЗАНТАК⁷⁵?

Ранитидин е лекарство от групата на хистаминовите H₂-блокери.

Всяка таблетка съдържа:

- активно вещество – ранитидин 75mg (под формата на хидрохлорид);
- помощни вещества – микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, метил хидроксипропилцелулоза, титанов диоксид, триацетин, синтетичен червен железен оксид.

Как действа ЗАНТАК⁷⁵?

Стомашният сок съдържа солна киселина, която подпомага храносмилането. Понякога тази киселина е в по-голямо количество. Излишъкът ѝ предизвиква оплаквания, известни като киселини и нарушения в храносмилането (диспепсия). Обичайните противокиселинни средства съдържат вещества, които само неутрализират киселините. Затова ефектът им е краткотраен и трябва да се приемат при всяко хранене, за да противодействат на стомашния дискомфорт.

За какво се използва Зантак⁷⁵?

Таблетките **Зантак⁷⁵** действат по съвсем различен начин срещу излишъка от солна киселина и нарушеното храносмилане. Вместо да неутрализират киселината, те повлияват първопричината, като предотвратяват отделянето на прекомерно количество киселина. Една таблетка **Зантак⁷⁵** осигурява бърз ефект (проявява се до около половин час) и продължително облекчение (до 12 часа).

Не приемайте **Зантак⁷⁵** ако сте алергични към ранитидин или към някое от помощните вещества.

Преди да започнете употребата на ЗАНТАК⁷⁵

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате таблетките.

- Ако Ви е известно, че страдате от рядкото заболяване порфирия;
- Ако имате бъбречни или чернодробни проблеми;
- Ако сте под лекарско наблюдение (диспансеризирани);



- Ако сте в средна или напреднала възраст и се оплаквате от диспепсия (киселини), дискомфорт и/или болка в горната част на корема и при внезапна поява или бърза прогресия на вече изявиени в миналото проблеми със стомаха;
- Ако сте отслабнали внезапно без специална диета или друга причина при диспептични оплаквания;
- Ако приемате или наскоро сте приемали:
 - Лекарства намаляващи съсирването на кръвта, напр. варфарин;
 - Обезболяващи или нестероидни противовъзпалителни лекарства, напр. ацетилсалицилова киселина или ибупрофен;
 - Други лекарства, включително закупени без лекарско предписание.
- Ако Ви е известно, че страдате от пептична язва (стомашна или дуоденална);
- Ако сте бременна, опитвате се да забременеете или кърмите;

Как да приемате Зантак⁷⁵?

Възрастни (включително и тези в напреднала възраст) и деца над 16 години.

За предотвратяване на симптомите:

Вземете една таблетка **Зантак⁷⁵** с вода 30 минути до 1 час преди консумацията на храна и/или напитки, които биха могли да провокират подобни проблеми.

За лечение на симптомите:

Веднага след появата на оплаквания се приема една цяла таблетка **Зантак⁷⁵** с малко вода.

При повечето пациенти приемът на една или две таблетки дневно води до облекчаване на симптомите. Въпреки това, за период от 24 часа може да се приемат до 4 таблетки.

Не приемайте повече от 4 таблетки на денонощие.

Зантак⁷⁵ не се препоръчва за деца под 16 години!

При ежедневен прием продължителността на лечебния курс не трябва да надвишава 14 дни.

Какво трябва да се направи, ако сте приели повече от допустимите дози?

Ако случайно сте приели повече таблетки от препоръчаното, потърсете съвета на лекар или фармацевт!

Ако след започване на лечението оплакванията се засилят, не се повлияят или продължат повече от 14 дни, потърсете консултация с Вашия лекар!

Нежелани лекарствени реакции

При повечето пациенти, приемащи **Зантак⁷⁵**, не се наблюдават нежелани лекарствени реакции.

Както към всички други лекарства в редки случаи може да се прояви алергия и към **Зантак⁷⁵**. Ако скоро след като сте започнали да приемате таблетките се появят някои от следните реакции, **СПРЕТЕ** лекарството и незабавно уведомете лекаря:

- внезапно хриптене или стягане и болки в гръдния кош;
- подпухване на клепачите, лицето, устните, устата или езика;
- неравномерен (на бучки) обрив по кожата някъде по тялото;
- необяснимо висока температура;
- чувство на прималяване, особено когато ставате.



Спрете приема на лекарството и се посъветвайте с лекаря, ако страдате от чести инфекции или неочаквани наранявания.

Нежеланите реакции са редки. Все пак, ако забележите някои от следните нежелани реакции, консултирайте се с лекар колкото е възможно по-скоро:

- Необяснима уморяемост, задух или склонност към инфекции и контузии в резултат от промени в кръвната картина;
- Обърканост, депресия, халюцинации;
- Забавен или неритмичен пулс;
- Възпаление на кръвоносните съдове (васкулит);
- Силна стомашна болка, рядко свързана с възпаление на панкреаса;
- Възпаление на черния дроб, което може да е свързано с едно или повече от следните: гадене или повръщане (чувство за слабост), загуба на апетит, повишена температура, сърбеж, пожълтяване на кожата и очните ябълки, тъмно оцветена урина;
- Кръв в урината или промени в количеството на отделяната урина.
- Промени в лабораторните резултати при изследване на черния дроб.

Ако Ви вземат проби от кръв или урина или Ви правят други изследвания, уведомете лекаря, че приемате **Зантак⁷⁵**, тъй като това лекарство може да повлияе на резултатите от изследванията.

Ако имате други симптоми, които не разбирате, уведомете лекаря или фармацевта.

Как се съхраняват таблетките ЗАНТАК⁷⁵?

Както и всички други лекарства, **Зантак⁷⁵** трябва да се съхранява на недостъпно за деца място!

Не приемайте таблетките след изтичане срока на годност, посочен върху блистера и картонената кутия.

Кой произвежда ЗАНТАК⁷⁵?

Производител: Glaxo Wellcome S.A., Испания
Glaxo Wellcome GmbH, Германия
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Полша

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, Великобритания

Допълнителна информация

Как мога да избегна появата на киселини и нарушено храносмилане (диспепсия)?

Различни фактори допринасят за появата на диспептични оплаквания и киселини:

- преяждане;
- неправилно хранене (приемане на големи количества храна; приемане на мазни храни);
- наднормено телесно тегло;
- заседнал начин на живот, с недостатъчно движение;
- тютюнопушене;
- повишена консумация на алкохол.

В тези случаи се препоръчва смяна на начина на живот с цел избягване на гореизброените фактори. Така и смущенията в храносмилането ще намалеят.



В тази листовка не е дадена пълната информация за **Зантак**⁷⁵. Ако след прочитането ѝ възникнат някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Запазете листовката, може да поискате да я прочетете отново.

Тази листовка се отнася само за таблетки **Зантак**⁷⁵.

Зантак⁷⁵ е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

Без лекарско предписание.

Регистрационен № 9700362

Дата на актуализация на текста:

10/03/2009

