

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

№ 20060885-14.08.06

Одобрено: 41 / 14.09.09

6576 / 16.12.2009

PANADOL Baby 125mg suppositories
ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Бебе И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории е предназначен за деца на възраст над 3 месеца до 3 години. Облекчава лека до умерена болка при никнене на зъбки, зъбобол, главоболие и възпалено гърло и понижава температурата при настинки, грип и детски инфекции. Също така се препоръчва за понижаване на високата температура като пост-ваксинална реакция.

Как действа ПАНАДОЛ Бебе супозитории?

ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории съдържа парацетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и понижава повишената температура.

ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при преглъщане или повръща.

2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Бебе

Проверете преди да приемете това лекарство, ВАЖНО!

Запомнете: ПАНАДОЛ Бебе съдържа парацетамол.

Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не давайте ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории на деца, алергични към парацетамол или помощното вещество.

Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете ПАНАДОЛ Бебе супозитории, ако:

- детето има бъбречно или чернодробно заболяване;
- приема warfarin и подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта, или
- е имало проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото.

Да не се прилага при пациенти с диария, наскоро прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

Бременност и кърмене

Не е приложимо – лекарството е предназначено за употреба в педиатрията, за лечение на деца от 3 месеца до 3 години.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Бебе?

Дозировка: Деца над 3 месеца до 3 години:

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето.

Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема – 15 mg/kg еднократна доза.

Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

Да не се дават повече от 60 mg/kg за период от 24 часа.



Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.
Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар.
Ако състоянието на детето не се подобрява потърсете съвет от Вашия лекар.
Да не се дава на деца под 3 месеца.
Да не се приема през устата.

Начин на приложение:

Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сгъне краката възможно най-близо под брадичката.

Не надвишавайте посочената доза. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре, поради опасност от чернодробно увреждане.
Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да дадете необходимата доза на Вашето дете?

Дайте необходимата доза когато си спомните. Не давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума.

Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата, неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Бебе

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ Бебе супозитории?

Всяка супозитория съдържа 125mg парацетамол.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

Как изглежда ПАНАДОЛ Бебе и какво съдържа опаковката?

Панадол Бебе са супозитории с продълговата овална форма.
Опаковката съдържа PVC или PE блистери с по 5 супозитории.
Предлага се в опаковки съдържащи 10 супозитории.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW9 9GS, Великобритания

Производител е:
Farmaclair



440, Avenue de General de Gaulle
14200 Herouville Saint-Clair, Франция

Срок на годност – 5 години.
Без лекарско предписание.
Последна актуализация – декември 2009

GSK logo
Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

