

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №	20010896, 17.08.09
Одобрено	41 / 14.09.09
	6777 / 16.12.2009

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PANADOL* Extra 500mg/65mg film-coated tablets
ПАНАДОЛ* Екстра 500mg/65mg филмирани таблетки

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Екстра И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Екстра съдържа комбинация от две активни съставки: парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата) и кофеин, който засилва обезболяващото действие. ПАНАДОЛ Екстра не дразни стомаха. ПАНАДОЛ Екстра бързо и ефикасно облекчава слабата до умерена болка от различен произход (например главоболие, мигрена, болки в гърба, зъбобол, ревматични и мускулни болки и менструални болки) и понижава високата температура.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Екстра

Запомнете: ПАНАДОЛ Екстра съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не взимайте ПАНАДОЛ Екстра, ако сте алергични към парацетамол, кофеин или някоя от другите съставки.

ПАНАДОЛ Екстра не се препоръчва по време на бременност.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Екстра, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващи средства всеки ден за продължителен период;
- не може да приемате обичайните дози парацетамол;
- кърмите.

Това лекарство съдържа кофеин. Избягвайте приемането на големи количества чай, кафе или кофеин съдържащи напитки докато взимате ПАНАДОЛ Екстра. Повишеният прием на кофеин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате проблеми със съня или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест в гърдите.

Бременност и кърмене

Комбинацията парацетамол/кофеин не се препоръчва по време на бременност поради възможно повишаване на риска от спонтанен аборт, свързан с употребата на кофеин. Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества. Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене. Кофеин се излъчва в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.



3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Екстра?

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

1 (една) – 2 (две) таблетки до четири пъти дневно при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4 дози) за период от 24 часа.

Да не се дава на деца под 12 години.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се превишава препоръчаната доза.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появат язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Екстра

Да се пази на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ Екстра?

Всяка таблетка съдържа като активни вещества:

парацетамол	500mg
кофеин	65mg

Също така съдържа помощни вещества: царевично нишесте, нишесте, поливидон, натриев сорбат, талк, стеаринова киселина, кроскармелоза, хидроксипропилметилцелулоза, триацетин и пречистена вода.

Как изглежда ПАНАДОЛ Екстра и какво съдържа опаковката?

Панадол Екстра са бели таблетки с формата на капсула със заоблени краища.

"Panadol Extra" е релефно шампован от едната страна на таблетката.

Опаковката може да съдържа 12, 24 или 48 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare



GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

Срок на годност – 4 години.

Без лекарско предписание.
Последна актуализация – юли 2009

GSK logo
Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

