

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Листовка - Приложение 2 Към ВУ № 20060386, 14.08.06 Одобрено: 41 / 14.09.09
--

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**PANADOL Junior** 250mg suppositories  
**ПАНАДОЛ Джуниър** 250mg супозитории

П-6496 / 16.12.2009

**Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Джуниър И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**

ПАНАДОЛ Джуниър 250mg супозитории е предназначен за деца на възраст от 4 години до 12 години. Облекчава лека до умерена болка при зъбобол, главоболие и възпалено гърло и понижава високата температура при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили.

**Как действа ПАНАДОЛ Джуниър супозитории?**

ПАНАДОЛ Джуниър супозитории съдържа парацетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и повишена температура. ПАНАДОЛ Джуниър супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при преглъщане или повръща.

**2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Джуниър**

**Проверете преди да приемете това лекарство, ВАЖНО!**

**Запомнете: ПАНАДОЛ Джуниър съдържа парацетамол.**

**Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.**

Не давайте ПАНАДОЛ Джуниър супозитории на деца, алергични към парацетамол или помощното вещество.

**Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете ПАНАДОЛ Джуниър супозитории, ако:**

- детето има бъбречно или чернодробно заболяване;
- приема warfarin и подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта, или
- е имало проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото.

Да не се прилага при пациенти с диария, наскоро прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

**Бременност и кърмене**

Не е приложимо – лекарството е предназначено за употреба в педиатрията, за лечение на деца от 4 до 12 години.

**3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Джуниър?**

**Дозировка: Деца от 4 до 12 години:**

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето. Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема – 15 mg/kg еднократна доза.

Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

**Да не се дават повече от 60 mg/kg за период от 24 часа.**



Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.  
Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар.  
Да не се дава на деца под 4 години освен по лекарско предписание.  
Ако състоянието на детето не се подобрява потърсете съвет от Вашия лекар.  
Да не се приема през устата.

**Начин на приложение:**

Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сгъне краката възможно най-близо под брадичката.

**Не надвишавайте посочената доза.** Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре, поради опасност от чернодробно увреждане.  
Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.

**Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да дадете необходимата доза на Вашето дете?**

Дайте необходимата доза когато си спомните. Не давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

**4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума.

Спрете приема на лекарството и се консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата, неочаквано кървене или склонност към насиняване.

**5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Джуниър**

**Да се пази на място, недостъпно за деца.**

Да се съхранява при температура под 25°C.  
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

**6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа ПАНАДОЛ Джуниър супозитории?**

Всяка супозитория съдържа 250mg парацетамол.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

**Как изглежда ПАНАДОЛ Джуниър и какво съдържа опаковката?**

Панадол Джуниър са супозитории с продълговата овална форма.

Опаковката съдържа PVC или PE блистери с по 5 супозитории.

Предлага се в опаковки съдържащи 10 супозитории.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

Farmaclair

440, Avenue de General de Gaulle



14200 Herouville Saint-Clair, Франция

Срок на годност – 5 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – декември 2009

GSK logo

Panadol\* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

