

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PANADOL* RAPIDE 500mg film-coated tablets
ПАНАДОЛ* РАПИД 500mg филмирани таблетки

Одобрено:

21030001-17.03.08
41/14.09.09

6498/16.12.2009

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Рапид И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Рапид облекчава болката при главоболие, включително мигрена, зъболбол, ревматични, мускулни и менструални болки.

ПАНАДОЛ Рапид облекчава неразположението при възпалено гърло и висока температура и при болки при простудни заболявания и грип.

Как действа ПАНАДОЛ Рапид?

ПАНАДОЛ Рапид съдържа парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Таблетките са специално разработени, така че парацетамол се абсорбира в кръвта най-малко два пъти по-бързо от стандартните таблетки с парацетамол.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Рапид

Запомнете: ПАНАДОЛ Рапид съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не взимайте ПАНАДОЛ Рапид, ако сте алергични към парацетамол или някоя от другите съставки.

Важна информация относно някои от съставките на ПАНАДОЛ Рапид:

Всяка таблетка съдържа 173 мг натрий. Не приемайте таблетките, ако сте на ниско солева диета.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Рапид, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващи всеки ден за продължителен период. Въпреки това, може да приемате епизодично единични дози парацетамол за кратък период от време;
- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- сте бременна или кърмите;
- очаквате високите дози натриев бикарбонат да предизвикат гастро-интестинални смущения, включително оригване и гадене. Високи дози натрий могат да доведат до хипернатриемия и това състояние трябва да бъде следено.



Бременност и кърмене

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.
Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества.
Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Рапид?

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

Една до две таблетки до четири пъти на ден при необходимост.

Дозата да не се взима на интервали, по-кратки от 4 часа.

Възрастни: Да не се взимат повече от 8 таблетки (4000mg парацетамол) за 24 часа.

Деца на и над 12 г.: Да не се взимат повече от 6 таблетки за 24 часа.

Деца под 12 години: Не се препоръчва при деца под 12 години.

Да не се надвишава препоръчаната доза.

Ако температурата се запази в продължение на 3 дни, а болката повече от 5 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появяват язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Рапид

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 30°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ Рапид?

Всяка таблетка съдържа парацетамол 500 mg

Съдържа също така натриев бикарбонат, разтворимо нишесте, повидон, царевично нишесте, калиев сорбат (E202), микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, восък карнауба, титаниев диоксид (E171), полидекстроза, хидроксипропил метилцелулоза, глицерол триацетат и полиетилен гликол.



Как изглежда ПАНАДОЛ Рапид и какво съдържа опаковката?

Панадол Рапид са бели, овални, двойно изпъкнали таблетки със заоблени краища и делителна черта от едната страна.

Опаковката съдържа 10, 14 или 20 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd,

Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

Срок на годност – 3 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – декември 2009

GSK logo и Panadol* е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

