

## **SOLPADEINE\*** **СОЛПАДЕИН**

---

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

<b>Състав:</b>	Всяка таблетка съдържа
Paracetamol	500 mg.
Codeine Phosphate Hemihydrate	8 mg.
Caffeine	30 mg.

Също така съдържа: натриев бикарбонат, сорбитол, натриев захарин, натриев лаурил сулфат, лимонена киселина, натриев карбонат, поливидон и диметикон.

Опаковката съдържа 12 разтворими таблетки.

**Показания:** Solpadeine се препоръчва за бързо облекчаване на слаба до средно изразена болка (ревматична болка, главоболие, мигрена, невралгия, зъбобол, възпалено гърло, менструални болки), за повлияване на високата температура и другите симптоми при простуда и грип.

**Характеристики:** Solpadeine съдържа три активни съставки: парацетамол – аналгетик (успокоява болката) и антипиретик (понижава температурата), кодеин фосфат - аналгетик и кофеин, който засилва обезболяващото действие.

**Противопоказания:** **Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.** Не взимайте лекарството, ако сте алергични към парацетамол, кодеин или кофеин или към някоя от другите съставки.

**Предупреждения и предпазни мерки при употреба:** Преди да вземете Solpadeine, консултирайте се с Вашия лекар:

- ако имате тежкобъбречно или чернодробно заболяване,
- ако страдате от хипертрофия (уголемяване) на простата,
- ако имате тежко възпаление или запушване на червата,
- ако сте бременна или кърмите,
- ако имате заболявания на дихателната система, протичащи със задух,
- ако взимате лекарства, предписани Ви за депресия, или други лекарства, влияещи на централната нервна система, напр. седативни сънотворни,
- ако взимате лекарства, предписани от лекар за лечение на гадене и повръщане (например метоклопрамид, домперидон) или за понижаване нивото на холестерин (напр. холестирамин),
- ако взимате антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта).

Приемането на големи количества чай или кафе докато взимате Solpadeine може да Ви направи раздразнителни и напрегнати.

**Бременност и кърмене**

Употребата на Solpadeine по време на бременност не се препоръчва, но може да бъде приеман по време на кърмене, ако лекарят прецени така.

**Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

Solpadeine може да причини виене на свят. Ако почувствате замаяване, не карайте кола и не работете с машини.

**Дозировка:**

**Възрастни и деца над 12 години:**

2 таблетки, разтворени в не по-малко от половин чаша с вода, до 4 пъти на ден при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 4 дози (8 таблетки) за период от 24 часа.

Да не се приема повече от 10 дни без консултация с лекар.

Не се препоръчва при деца под 12 години.

Ако симптомите се запазят повече от 3 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

**Не надвишавайте посочената доза.** Приемането на прекалено голямо количество парацетамол може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

**Нежелани реакции:** При парацетамол, нежеланите реакции са редки.

Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, които не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

Кодеин може да причини запек, гадене, виене на свят или сънливост, но тези нежелани реакции се наблюдават много рядко при приемане на препоръчаните дози. Най-често наблюдаваните при кофеин нежелани реакции са: гадене, поради гастро-интестинално дразнене, безсъние и безпокойство в резултат от стимулирането на централната нервна система. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

**Срок на годност:** Не използвайте след датата, посочена на опаковката. Срок на годност - 4 години.

**Условия на съхранение:** Да се съхранява при температура под 25°C.

**Да се съхранявана места, недостъпни за деца.**

**Производител:**

GlaxoSmithKline, Dungarvan, Ireland

**Притежател на разрешението за употреба:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd,  
Brentford, TW8 9GS, UK

Solpadeine\* е търговска марка.